

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

LXXXIV. — PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS (SUITE).

PAR A. GUILLAUMIN.

- Agation Pancheri* Brong. — Houaïlou (*Vieillard*).  
*A Vieillardii* Brong. — Balade (*Vieillard* 112 pro parte).  
*Calophyllum caledonicum* Vieill. et Planch. et Tr. — Pouébo, Wagap (*Vieillard* 174).  
*Sida rhombifolia* L. — Nouméa (*Vieillard* 140 A).  
*Hugonia Deplanchei* Vieill. ex Guillaum. — Sans localité (*Pancher* 606).  
*H. neo-caledonica* Vieill. ex Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 16).  
*Tristellateia australasica* A. Rich. — Ponérihouen (*Vieillard* 2195).  
*Celastrus paniculata* Willd. var. *Balansæ* Loes. — Nouméa (*Deplanche* 92 in *Vieillard* 3076).  
*Acronychia lævis* Forst. — Wagap (*Vieillard* 285).  
*Murraya exotica* DC. — Gatopé (*Vieillard* 312).  
*Acacia spirorbis* Labill. — Balade, Touho, Canala, Nouméa (*Vieillard* 412).  
*Eugenia ericoides* Guillaum. — Sans étiquette.  
*E. ploumensis* Dänik. — Canala (*Vieillard* 782).  
*Casearia Melistaurum* Spreng. — Balade (*Vieillard* 873, 874).  
*Melodinus Balansæ* Baill. — Pouébo (*Deplanche* 65 in *Vieillard* 2978).  
*M. phyllireoides* Labill. — Wagap (*Deplanche* 69 bis in *Vieillard* 2976), Gatopé (*Vieillard* 2977, 945 ?), Gomonen (*Vieillard*), Paaba (*Deplanche* 88).  
*Rauwolfia semperflorens* Schltr. — M'bée (*Deplanche* 63), Canala (*Vieillard*), Pòume (*Vieillard* 915), Pòume, Tanlé (*Deplanche* 458), Cap Tonnerre (*Vieillard* 196).  
*R. viridis* Guillaum. — Gatopé, Témala (*Vieillard* 2971).  
*Psychotria collina* Labill. — Sans localité (*Vieillard* 696).  
*P. deverdiana* Guillaum. — Gatopé (*Vieillard* 3050).  
*P. nummularioides* Guillaum. — Lifou (*Deplanche* 29), « Feto ».  
*Tapeinosperma wagapense* Mez ? — Balade (*Vieillard* 1035). Inflorescence atteinte de phyllomanie.  
*Leptostylis filipes* Benth. — Cap Tonnerre (*Deplanche* 209). C'est à tort que Bachni indique en Nouvelle-Calédonie le *Planchonella antheridifera* White et Francis, Busna ou Lane-Poodle l'a découvert est en Nouvelle-Guinée.

- Podochrosia Balansæ* Baill. — Sans localité (*Vieillard* 2975 in *Pancher*), Wagap (*Vieillard* 2948).
- Cerbera Odollam* Gaertn. — Très commun (*Deplanche* 55 in *Vieillard* 962), Gatope (*Vieillard*).
- C. obtusifolia* von Heurck et Müll. Arg. — Gatope (*Deplanche* 240), Gomonen (*Vieillard*).
- Cerberiopsis Candelabrum* Vieill. ex Panch. et Seb. — Wagap (*Vieillard* 971).
- Ochrosia miana* Baill. — Canala (*Vieillard* 2954), Balade (*Vieillard* 969).
- O. parviflora* Hemsl. — Nouméa, Gatope, etc. (*Vieillard* 1073), Balade (*Vieillard* 967), Tanlé (*Deplanche* 130), Mouac, Tanlé (*Deplanche* 100).
- Alyxia affinis* v. Heurck et Müll. Arg. — Sans localité (*Vieillard* 11, 949 pro parte).
- A. breviflora* v. Heurck et Müll. Arg. — Sans localité (*Vieillard* 314), Balade (*Vieillard* 953, 933 = 951), Tanlé (*Vieillard* 124).
- A. brevipes* Schltr. — Gatope (*Vieillard* 954 pro parte), Lifou (*Deplanche*).
- A. caletiioides* Guillaum. — Sans localité (*Pancher*).
- A. Johnsoniæ* S. Moore — Sans localité (*Deplanche* 32), Nouméa (*Vieillard* 2961), Canala (*Vieillard* 2962 et sans n°), Wagap (*Vieillard* 2963), Pouébo (*Deplanche* 31 in *Vieillard* 959), Gatope (*Vieillard* 2961, 2965), Wagap, Gatope (*Vieillard* 2961).
- A. leucogyne* v. Heurck et Müll. Arg. — Wagap (*Vieillard* 944), île Grand Tupiti (*Vieillard* 958, *Deplanche* in *Vieillard* 944).
- A. Microbuxus* Guillaum. — Gatope (*Vieillard* 2967 pro parte 2969, *Deplanche* 429 in *Vieillard* 2969), Gomonen (*Vieillard*), Tupiti (*Deplanche* 429 in *Vieillard* 2969).
- A. nummularia* S. Moore. — Wagap (*Vieillard* 2964), Gatope (*Vieillard* 2965).
- A. podocarpa* v. Heurck et Müll. Arg. — Nouméa (*Vieillard* 959), Pouébo (*Deplanche* 454).
- A. rosmarinifolia* Guillaum. — Gatope (*Vieillard* 2966 pro parte, 2967 pro parte, 2970), Gomonen (*Vieillard* 2970).
- A. torquata* Guillaum. — Canala, Gatope (*Vieillard* 2968), Gatope (*Vieillard* 2966 pro parte).
- Alstonia Balansæ* Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 758).
- A. cfr. A. Balansæ* Guillaum. ? — Gatope (*Vieillard* 2947).
- A. coriacea* Panch. ex Guillaum. (nomen) S. Moore (descript.) ? — Canala (*Vieillard* 708).
- A. filipes* Schltr. ex Guillaum. — M'bée (*Vieillard* 930), Balade (*Vieillard* 926), Poume (*Deplanche* 462).
- A. Legouixiæ* v. Heurck et Müll. Arg. — Sans localité (*Pancher* in *Vieillard* 2943), Ounia (*Vieillard* 918), Wagap (*Vieillard* 920).

- A. lanceolata* V. Heurck et Müll.-Arg. — Balade (*Vieillard* 928).
- A. Lenormandii* v. Heurck et Müll. Arg. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 2956).
- A. linearifolia* Guillaum. — Poume (*Vieillard* 202), Poume, Gomonen (*Vieillard* 221), Cap Tonnerre, Néhoué (*Vieillard* 2950, *Deplanche* 466 in *Vieillard* 2950 et in *Mus. néocal.* 115).
- A. plumosa* Labill. — Sans localité (*Vieillard* 929), Wagap (*Vieillard*), Balade (*Vieillard* 916, 923, 970).
- A. quaternata* v. Heurck et Müll. Arg. — Sans localité (*Vieillard* 324). Canala (*Vieillard* 2942), Wagap (*Vieillard*), Pouébo (*Deplanche* 157, 459, 456 = 452 in *Vieillard* 2944), Diaoué (*Vieillard* 932).
- Pagiantha cerifera* Mgf. — Canala (*Vieillard* 972), Balade (*Vieillard*, 967), Hienghène (*Vieillard* 2957), Schio (*Deplanche* 74).
- Ervatamia orientalis* Turrill — Sans localité (*Vieillard* 763).
- Personsia* cfr. *P. affinis* Baill. ? — Sans localité (*Pancher*).
- P. angustifolia* Baill. — Balade (*Vieillard* 984 bis).
- L'échantillon : Balade (*Vieillard* 982) sans fleurs dans l'herbier de Paris y est rapporté par Baillon à cette espèce ; en réalité c'est une Asclépiadacée ainsi que le montre l'échantillon de Caen qui est fleuri.
- P. Balansæ* Baill.
- C'est par suite d'un lapsus que l'échantillon : Dumbéa (*Le Rat* 2623) a été indiqué comme « *Marsdenia* » *Balansæ*, c'est « *Personsia* » *Balansæ* qu'il faut lire.
- P. brachiata* Baill. ex Guillaum. — Sans localité (*Pancher* 29, *Vieillard* 2984 ?, *Deplanche* 474 in *Vieillard* 2984), Balade (*Vieillard* 944).
- P.* cfr. *P. brachiata* Baill. ex Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 979, *Deplanche* 72), Balade (*Vieillard* 936, 938), Gatope (*Vieillard* 2992).
- Le type du *P. brachycarpa* de Baillon : Poume (*Balansa* 3283) est en fruit ; les échantillons de Caen ont quelques fleurs et montrent évidemment qu'il s'agit non d'une Apocynacée mais d'une Asclépiadacée du genre *Marsdenia*, ce sera le ***Marsdenia brachycarpa***. Guillaum. nom. nov. — Wagap (*Vieillard* 3002), Canala (*Vieillard* 3002).
- P. calophylla* Baill. ex Guillaum. — Canala (*Vieillard* 2981), Wagap (*Vieillard* 2982), Balade (*Vieillard* 942).
- P. carnea* Panch. ex Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 975, 979), Mont Mou (*Deplanche* 73 in *Vieillard* 2993), Néhoué (*Deplanche* 472 in *Vieillard* 3005), Canala (*Vieillard* 2987), *Deplanche* 71 in *Vieillard* 2985).
- P.* cfr. *P. carnea* Panch. ex Baill. — Sans localité (*Pancher* 270 in *Vieillard* 2994), Balade (*Vieillard* 940).

- P. catalpæcarpa* Baill. — Sans localité (*Deplanche* 72 in *Vieillard* 935), Sommet d'Arama (*Deplanche* 72 in *Vieillard* 935, *Deplanche* 150).
- P. corymbifera* Baill. ex Guillaum. — Balade (*Vieillard* 941).
- P. edulis* Guillaum. — Nouméa (*Vieillard* 2983).
- P. Francii* Guillaum. — Wagap (*Vieillard* 3001).
- P. glaucescens* Baill. ex Guillaum. ? — Poila (*Vieillard* 985), île des Pins (*Pancher* 268 ?).
- P. populifolia* Baill. — Canala (*Vieillard* 939).
- P. rigida* Baill. — Paulotche (*Vieillard* 2986).
- P. scabra* Guillaum. — Sans localité (*Vieillard* 943).
- P. sp. nov.* ? Canala (*Vieillard* 972), Gatope (*Vieillard* 2989).
- P. sp. nov.* ? — Tanlé (*Deplanche* 43 et 473 in *Vieillard* 2988).
- P. sp. nov.* ? — Sans localité (*Deplanche* 227), Canala (*Deplanche* 228).
- Marsdenia Balansæ* Baill. — Sans localité (*Vieillard* 382), Poila (*Vieillard* 973).
- M. Billardieri* Dcne. — Sans localité (*Vieillard* 983), Yaté (*Vieillard* 983), Gomonen (*Deplanche* 68 in *Vieillard* 984).
- M. ! lyonsioides* Schltr. ?? — Poila (*Vieillard* 985).
- M. microstoma* Schltr. — Canala (*Vieillard*), Tanlé (*Deplanche* 128, 468 in *Vieillard* 984 bis pro parte et 120 in *Mus. néocal.*), Gomonen (*Deplanche* 68 in *Vieillard* 984), Gatope (*Vieillard* 984 bis, 2992 pro parte, 3004). Gatope, Néhoué (*Vieillard* 3004).
- M. oubatchensis* Schltr. — Nouméa (*Vieillard* 981), Gatope (*Deplanche* 470 in *Vieillard* 982 pro parte).

**M. Pseudo-Parsonsia** Guillaumin sp. nov.

*Sarmentosus, ramis gracilibus, flexuosis, cito glabris, foliis linearibus vel angustissime ellipticis (3,5-7 cm. × 0,8 — 0,3 cm.), apice acutis, rariu, rotundatis, basi rotundatis, rigide membranaceis, glabris, nervis inconspicui s petiolo circa 5 mm. longo, primum sparse puberulo. Umbellæ axillares, paucifloræ, pedunculo puberulo, pedicellis æquilongo, circa 3 mm. longo, calyce segmentis ovatis, 1 mm. longis, apicem versus, sparse ciliolulatis, corolla urceolata, 3 mm. longa, lobis ovatis, tubo fere æquilongis, extra glabra, intus fauce dense rigide barbata, infra sparsius molliter pilosa, coronæ foliolis dimidio superiore liberis, lanceolatis membranaceisque, stigmatis apicem superantibus, infra incrassatis, dorso antherarum adnatis, appendice hyalino apice truncato erecto, pollinis oblongis, retinaculo cylindrico dimidio brevior, caudiculis brevissimis, stigmatibus actue umbonato.*

Montagnes (*Vieillard* 988), Balade (*Vieillard* 982), Balade, Gatope (*Vieillard* 982), sommet d'Arama (*Deplanche* 149 et 471 in *Vieillard* 988).

L'échantillon: Balade (*Vieillard* 982), sans fleurs dans l'herbier de Paris, y est rapporté par Baillon à son *Parsonsia angustifolia* et cité (*Bull. Soc. Linn. Paris* I, p. 776) comme l'un des types de son espèce.

*Secamone insularis* Schltr. — Nouméa (*Deplanche* 70 in *Vieillard* 981), Wagap (*Vieillard* 2998), Wagap, Arama (*Vieillard* 2998), Bondé (*Vieillard* 986), Poume (*Deplanche* 467 in *Vieillard* 2997), Gatope (*Vieillard* 986).

— Var. *angusta* Schltr. — Wagap (*Vieillard* 2996), Tanlé (*Deplanche* 135), Poume (*Deplanche* 467 in *Vieillard* 2997).

*Sarcostemma australis* R. Br. — Gatope (*Vieillard* 976).

*Sarcobus lifuensis* Guillaum. — Yaté (*Vieillard* 974), Lifou (*Vieillard* 974).

***Tylophora micrantha* Guillaum. sp. nov.**

*Sarmentosus, ramis minutissime puberulis, foliis ovatis (3-4,5 × 2-3 cm.), apice rotundatis, basi rotundatis truncatis vel subcordatis, glabris, membranaceis, triplinerviis, petiolo gracili, 1,5-2 cm. longo. Inflorescentiae axillares, paniculatim umbellatae, parce ramosæ, multifloræ, ad 3 cm. longæ, floribus minutis, pedicello tereti, circa 2 mm. longo, calycis segmentis ovatis, obtusis, 0,5 mm. longis, corollae lobis lanceolatis 1 mm. longis, intus rigide pilosis, extra glabris, tubo 2-plo brevior, glaberrimo, coronae foliis tubo staminum alte adnatis, carnosis, lanceolatis, staminibus aequilongis, antheris quadratis, appendice hyalina rotundata brevi, polliniis obovoideis, translatoribus brevissimis, glandula lineari, brevi, stigmatis capite umbonato.*

Balade (*Vieillard* 987).

Remarquable par ses fleurs minuscules, sa corolle à poils raides formant brosse en dedans et la grande longueur des pièces de la coronule. Diffère des *Tylophora* typiques par ses pollinies atténuées vers le caudicule qui est extrêmement court et s'en distingue mal.

Corolle glabre, pièces de la coronule plus courtes que les anthères.....	}	<i>T. anisotomoides</i>
		<i>T. tapeinogyne</i>
Corolle velue en dedans, pièces de la coronule aussi longues que les anthères.....	}	<i>T. insulicola</i>
		<i>T. micrantha</i>

*T. tapeinogyne* Schltr. — Sans localité (*Deplanche* 62 in *Vieillard* 2993, *Pancher* 271).

*Hoya neo-caledonica* Schltr. — Sans localité (*Vieillard* 975), Balade, Canala (*Vieillard*).

*Mitrasacme nudicaulis* Reinw. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 2332).

\**M. polymorpha* R. Br. — Lifou (*Deplanche* j.).

Correspond à la forme très velue qu'on a appelée *M. cinerascens*.

*Geniostoma Balansæanum* Baill. — Mont Koghi (*Pancher* 543).

*G. densiflora* Baill. — Paulotche près Gatope (*Vieillard* 3006).

*G. Deplanchei* Vieill. — Nouméa (*Vieillard* 3014), île des Pins (*Pancher* 623).

*G. fœtens* Baill. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 2470), Lifou (*Deplanche* 59 in *Vieillard* 3015).

- C. glaucescens* Schltr. — Pouébo (*Deplanche* in *Vieillard* 3015).  
*G. oleifolium* S. Moore — Baie de Tupiti (*Deplanche* 476 bis, in *Vieillard* 3016).  
*G. oleifolium* S. Moore ? — Wagap (*Vieillard* 3018, 3019, 3019 bis),  
Tupiti (*Deplanche* 476 bis), Tupiti, Poume (*Vieillard* 212, 3016),  
Touho (*Vieillard* 3017,) M'bée (*Vieillard* 704).  
*G. Pancheri* Baill. — Sans étiquette, Nouvelle-Calédonie (*Deplanche*  
18 in *Vieillard* 3009), Canala (*Vieillard* 3020), Balade (*Vieillard*  
701), Poume (*Pancher* 130).  
*G. Vieillardii* Baill. — Pouébo (*Deplanche* 476 in *Vieillard* 3013 et  
131 in *Mus. néocal.*).  
*G. sp.* cfr. *G. Vieillardii* Baill. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* 17  
pro parte in *Vieillard* 3021).  
*Fagraea Schlechteri* Gilg et Ben. — Canala (*Vieillard* 963), Balade  
(*Vieillard* 963).  
*Nymphoides indicum* O. Ktze.  
Il semble qu'il y ait 2 types, l'un à grandes feuilles atteignant  
15 cm. de diamètre : Paita (*Balansa* 1378), Gatope (*Vieillard* 3022),  
l'autre à petite feuilles de 2-6 cm. de diamètre : Nouvelle-Calédonie  
(*Deplanche* 76, *Vieillard* 991, *Védel*), Canala (*Pancher* 590), Wagap  
(*Vieillard* 991) « *Warrenedo* ».  
La petite forme serait spéciale aux mares, fossés et cultures irri-  
guées tandis que la grande ne se trouverait que dans les mares.  
*Erythraea spicata* L. — Nouméa (*Vieillard* 76), Wagap (*Vieillard* 990).  
\**Cordia Cumingiana* Vidal — Wagap (*Vieillard* 3033).  
*C. Myxa* L. — Wagap (*Vieillard* 1022); Pati, Pouébo (*Deplanche*).  
*C. subcordata* Lam. — Balade (*Vieillard* 1023), île des Pins (*Pancher*  
in *Vieillard*).  
*Ipomæa Batatas* Lam. — Balade (*Vieillard* 1009).  
*I. biloba* Forsk. — Balade, Gatope (*Vieillard* 1015).  
*I. Bona-Nox* L. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 1016), Gatope  
(*Vieillard* 3029).  
*I. campanulata* L. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 1010).  
*I. congesta* R. Br. — Port boisé (*Vieillard* 3030).  
*I. digitata* L. — La Conception (*Pancher* 622).  
*I. palmata* Forsk. — Gatope (*Vieillard* 1008).  
*Jacquemontia paniculata* Hallier f. — Nouméa (*Deplanche* 482 in  
*Vieillard* 1014), Gatope (*Vieillard* 1014).  
*Polymeria pusilla* R. Br. — Nouméa, Gatope (*Vieillard* 1017).  
*Solanum auriculatum* Ait. — Boulari (*Pancher*).  
*S. sp.* voisin de *S. austro-caledonicum* Seem. mais probablement dis-  
tinct. — Nouvelle-Calédonie (*Vieillard* 3036, *Védel*), Néhoué  
(*Deplanche* 143 in *Mus. néocal.* et un *Vieillard* 1025), Balade  
(*Vieillard* 1025).

\***S. Deplanchei** Guillaum. sp. nov.

*Frutex* 1 m. altus, ramis gracilibus virgatis, fere omnino inermibus, glaberrimis, foliis ovatis (1,5-2,5 cm. × 0,5-1 cm.), apice rotunatis vel obtusis, basi æquilater rotundatis, glaberrimis, membranaceo rigidis, nervis immersis, petiolo brevi (2-5 cm. longo), glaberrimo. Flores albi, ad ramulorum apicem, 1-2-3-ni, pedicello 1 cm. longo, capillari, ad apicem incrassato erecto, calyce cupulato, fere ad medium fisso, lobis 5, triangularibus, breviter acuminatis, glabris, circa 0,5 cm., longis, corolla ad medium fissa, lobis ovato-triangularibus, 4 mm. longis, intus glabris, extra stellato-pilosis, staminibus 5, fertilibus, antheris linearibus, 4 mm. longis, filamentis brevissimis, corollæ tubi 3<sup>a</sup> infima parte insertis, ovario minimo, globoso, glaberrimo, stylo sigmoideo, glaberrimo, antheras superante, stigmate vix incrassato.

Néhoué (*Deplanche* 484 in *Vieillard* 3040 et 142 pro parte in *Mus. néocal.*)

Uarai (*Pancher* in *Vieillard* 1032).

En partie confondu par les collecteurs avec le *S. Pancheri* Guillaum. mais fleurs du type 5 et feuilles différentes.

\***S. linearisepalum** Guillaum. nov. sp.

*Frutex* 1 m. altus, ramis nigris, glabris vel pilis stellatis aliquis tantum sparsis, foliis ovatis (usque ad 10 cm. × 5 cm.), apice obtusis vel breviter acuminatis, basi ≠ inæqualiter rotundatis, junioribus ad basin costa tantum sparsissime stellato-pilosis, petiolo 1-2 cm. longo, supra stellato piloso. Racemi terminales, usque ad 5 cm. longi, pedicellis glabris, usque ad 1,5 cm. longis, floribus albis, calyce fere usque ab basin fisso, lobis 5, linearibus, ad 3 mm. longis, glabris, corolla extra in alabastro deinde medio tantum dense puberula, lobis 5, triangularibus, ad medium fissa, 10-11 cm. longa, staminibus 5 fertilibus, filamentis brevibus, glabris, antheris obclavatis, glabris 5 mm. longis, ovario globoso, glaberrimo, stylo recto, ad basin sparsissime stellato piloso, antheras superante. Fructus globosi, 1 cm. diam.

Balade (*Lahaie* 1355), Tanlé (*Deplanche* 77, 423 et in *Vieillard* 3038, *Pancher* 141).

Bien caractérisé par la forme des lobes du calice.

*S. nigrum* L. — Gatope (*Vieillard* 3044), Lifou (*Deplanche* 230).

*S. noumeanum* Bitter — Nouméa (*Vieillard* 25), Koé (*Brousmiche* 120)?, Balade (*Vieillard* 3034)?

*S. pseuderanthenoides* Schltr. — Nouméa (*Vieillard* 3042).

*S. sp. aff. S. pseuderanthenoides* Schltr. — Nouméa (*Vieillard* 3043).

*S. Vieillardii* Bitter — Lifou (*Vieillard* 3025).

*Physalis minima* L. — Gatope (*Vieillard* 1024).

*Duboisia myoporoides* R. Br. — Balade, Wagap (*Vieillard* 1031).

*Coronanthera barbata* C. B. Clarke — Wagap (*Vieillard* 2827).

*C. sericea* C. B. Clarke — Balade (*Vieillard* 872).

*Depanthus glaber* S. Moore — Wagap (*Vieillard* 3235).

*Periomphale! Pancheri* Baill. ? — Balade (*Vieillard* 871).

- Pandorea austro-caledonica* Bur. — M'bée (Vieillard 1005).  
*Diplanthera Deplanchei* F. Muell. — Nouvelle-Calédonie (Panther 253), Nouméa (Panther in Vieillard 3024), Wagap (Vieillard 1036), Kokingone près Wagap (Vieillard 3023).  
*D. sessilifolia* Vieill. ex Guillaum. — Poindalou près Gatope (Vieillard 3026).  
*Dolichandrone spathacea* K. Schum. — Hienghébane (Deplanche in Vieillard 1001).  
*Utricularia cyanea* R. Br. — Baie du Sud (Panther).  
*Hemigraphis reptans* T. Anders. — Nouméa (Vieillard 63), Lifou (Deplanche 61) « Kouamezé ».  
*Graptophyllum pictum* Griff. — Wagap (Vieillard).  
*Pseuderanthemum incisum* R. Ben. — Nouméa (Vieillard 3047).  
*P. majus* Guillaum. — Touho près Gatope (Vieillard 2080).  
*P. tuberculatum* Radlk. — Lifou (Deplanche 16 in Vieillard 3049).  
*P. variable* Radlk. — Canala (Vieillard 3052), Gatope (Vieillard 1044, 3053), Gomonen près Gatope (Vieillard 3053).  
*Justicia pinensis* S. Moore — Wagap (Vieillard 1042).  
*J. sp.*, cfr. *J. pinensis* S. Moore — Wagap (Vieillard 3048).  
*Dicliptera caerulea* Schinz et Guillaum. — Canala (Deplanche 83), Lifou (Deplanche in Vieillard 3054).  
*Myoporum crassifolium* Forst. — Baie de Tupiti (Deplanche 476 bis), Poume (Deplanche 61), île des Pins (Vieillard 48).  
*M. tenuifolium* Forst. — Pouébo (Vieillard 3070), île des Pins (Deplanche 5, 312 in Vieillard 1051).  
*Ocimum Basilicum* L. var. *purpurascens* Benth. — Lifou (Vieillard).  
*Plectranthus parviflorus* Willd. — Nouméa (Vieillard 1056).  
*Coleus scutellarioides* Benth. — Sans localité (Vieillard 3071), Canala (Deplanche 85 in Vieillard 3071).  
*Salvia occidentalis* Sw. — Canala (Deplanche 88 in Vieillard 3072).  
*Leucas decemdentata* Sm. = *L. flaccida* R. Br. — Lifou (Vieillard 3073).

Le Gérant : Marc ANDRÉ.